

## Fragen und Antworten

- Wann sollte man den Kieferorthopäden aufsuchen?
- etwa im 9. / 10. Lebensjahr empfiehlt es sich bei den meisten Zahn- und Kieferfehlstellungen einen Beratungstermin zu vereinbaren
- beim offenen Biss, bei der Progenie und dem Kreuzbiss wird vom allg. Zahnarzt bereits im 5./6. Lebensjahr eine Konsultation beim Kieferorthopäden angeraten
- Was passiert beim 1. Termin?
- eine Vorstellung beim Kieferorthopäden kann jederzeit ohne Überweisung erfolgen
- es wird beim sogenannten Beratungstermin der Zahnstatus erhoben, die Kariesanfälligkeit des Gebisses, der Zustand des Zahnfleisches festgestellt sowie die kieferorthopädische Diagnose notiert
- danach wird von der behandelnden Ärztin festgelegt, ob eine Behandlungsaufnahme bereits beim 2. Termin erfolgt oder ob Kontrolltermine in größeren Abständen vorerst ausreichen oder eventuell eine Behandlung nicht notwendig ist
- Wie erfolgt die kieferorthopädische Behandlungsaufnahme? Zur Behandlungsaufnahme gehören für die korre Diagnostik:
- Abdrücke von Ober- und Unterkiefer
- zwei spezielle Röntgenbilder (Orthopantomogramm, Fernröntgenseitbild) zur Feststellung der Zahnzahl, Zahnstellung, Kieferlage und des Kieferwachstums
- zwei Fotos (frontal und seitlich) für die Profilanalyse und Erkennung evtl. Symmetrieabweichungen
- Muß der Versicherte bei der Krankenkasse den HKP einreichen ?
- nach abgeschlossener Diagnostik wird der genaue, individuelle Heil- u. Kostenplan erstellt und von unserer Praxis an die entsprechende gesetzliche Krankenkasse geschickt
- bei Privatversicherten wird der Heil- u. Kostenplan dem Patienten oder seinen Eltern zugeschickt, da in diesen Fällen der Patient der Vertragspartner des Kieferorthopäden ist, nicht die private Krankenversicherung des Patienten
- Wann beginnt die aktive kieferorthopädische Behandlung?
- nach der Kostenübernahmebestätigung der Krankenkasse dem Kieferorthopäden und dem Patienten oder seinen Eltern gegenüber beginnt die Behandlung , das heißt es erfolgt eine ausführliche Therapiebesprechung und der Abdruck für die erste Spange wird genommen
- etwa 3 - 5 Tage später erhält der Patient seine Spange